

INTERKOKASK®

Savremeni farmski dezinficijens širokog spektra, tačni koncentrat za profesionalnu upotrebu namenjen dezinfekciji objekata, opreme, dezobarijera i transportnih sredstava za životinje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INTERKOKASK® je koncentrovano dezinfekciono sredstvo za upotrebu u veterini namenjeno dezinfekciji svih tipova farmskih objekata, opreme i unutrašnjih površina, kao što su: zidovi, podovi, oprema, transportni boksovi i kavezi, boksovi za pse, vozila za transport životinja, karantini, čizme, otirači i dezobarijere. INTERKOKASK® je posebno formulisan i sadrži hlorokrezol koji kao snažan rastvarač masti prodire kroz trostruke zaštitne membrane jaja askarida i oocista kokcidija. Uklanja sve nezrele oblike parazita, što znači da je jednokratna primena proizvoda dovoljna za njihovo potpuno uklanjanje iz objekta.

Proizvod je bezbedan za korišćenje na vozilima, mašinama i opremi u preporučenim koncentracijama rastvora. Proizvod je efikasan i na hladnoći (testiran na 4°C), na višim temperaturama dejstvo je brže i u nižim koncentracijama. Proizvod je efikasan i u prisustvu organske materije.

Proizvod se ne sme koristiti u koncentrovanom obliku.

Potvrđena efikasnost proizvoda prema ciljnim patogenim mikroorganizmima i parazitima.

Na temperature od **4°C** i pri ekspoziciji od **30 minuta** potvrđuje:

1. Opšta dezinfekcija objekata (nepoznat uzročnik, prosečna čistoća, za sve životinje) **2%**.
2. Preventivna dezinfekcija objekata u živinarstvu **2%**.

Na temperature od **20°C** u visokom prisustvu organskih materija preporučuje:

1. Preventivna dezinfekcija objekata protiv *Mycobacterium avium* **0,5%** u trajanju od **60 minuta**.
2. Specijalna dezinfekcija objekata protiv *Mycobacterium avium*, veoma zaprljana sredina, **0,5%** u trajanju od **60 minuta**.
3. Dezinfekcija objekata protiv Bovini enterovirus Tip 1 **4%** u trajanju od **30 min**.
4. Specijalna dezinfekcija objekata protiv uzročnika *Mycobacterium avium* **1%** u trajanju od **1 sata**.
5. Dezinfekcija objekata protiv Crvene pipe (*Dermanyssus Gallinae*) i njenih jaja **3%** u trajanju od **24 sata. Tretirati ceo objekat**.
6. Dezinfekcija objekata protiv oocista kokcidija **4%** u trajanju od **2 sata. Zidove obavezno naprskati više od 2m visine**.
7. Dezinfekcija objekata protiv crevnih glista i njihovih jaja **2%** u trajanju od **2 sata**.
8. Dezobarijere za obuću i vozila- bakterije/ virusi/ gljivice (oociste kokcidija) **2% (3%)**. Rastvor obnavljati najmanje jednom nedeljno, u slučaju zaprljanosti i česte upotrebe češće.

Po isteku vremena ekspozicije tretirane površine nije potrebno ispirati vodom. Proizvod nije korozivan pri preporučenim razređenjima.

Po isteku vremena ekspozicije provetriti prostoriju najmanje 1 sat, a najbolje ostaviti da se osuši.

Rastvor proizvoda se nanosi na prethodno očišćene i osušene površine. Vlažne površine dovode do razređivanja rastvora, što negativno utiče na njegovu efikasnost.

UPUTSTVO ZA PRIMENU:

Ukloniti životinje i detaljno oprati objekat. Svu opremu za dezinfekciju isprati čistom vodom pre upotrebe. Uverite se da su svi tragovi prethodno korišćenih hemikalija uklonjeni. Pre početka posla pažljivo podesite opremu za prskanje. Dozirajte INTERKOKASK® prema uputstvu. U rezervoar sipajte izmerenu količinu proizvoda, a potom 5 puta veću količinu tople vode i dobro promešajte kako biste dobili predrastvor. Potom dodajte hladnu vodu do željenog razređenja. Površinu dezinfikujte pomoću prskalice visokog pritiska (idealno 70 bara), pumpe niskog pritiska (3- 4 bara) ili leđne prskalice (2-4 bara). Korišćenje širokougaone dizne je obavezno, pogotovu za prskalice visokog pritiska (fokusiranjem mlaza pod visokim pritiskom na površinu dolazi do efekta odbijanja mlaza). Prskanjem naneti 200- 400 ml radnog rastvora po kvadratnom metru tretirane površine. Poroznost tretirane površine povećava potrošnju radnog rastvora. Pogrešno podešavanje opreme za prskanje povećava potrošnju radnog rastvora, a može uticati i na efikasnost (efekat odbijanja). Površina neposredno nakon završenog tretmana mora biti ravnomerno vlažna. Alternativno, željena površina može se brisati krpom natopljenom u rastvor proizvoda. Tretirane površine ne dirati u trajanju minimalnog vremena ekspozicije, a najbolje ostaviti da se osuše preko noći. Po isteku vremena ekspozicije nije potrebno ispirati površine.

Proizvod je dovoljno primeniti jednokratno, na praznom objektu, posle pražnjenja, a pre useljenja nove grupe životinja. U dezobarijerama rastvor se menja na najviše 7 dana, po potrebi češće.

Važna napomena: po završetku posla, sve alatke, opremu za dezinfekciju, plastične i gumene delove (npr. prskalice, creva, plastične pumpe) isprati blagim rastvorom alkalnog detergenta ili čistom vodom.

RASPOLOŽIVA PAKOVANJA:

- Boca od 1kg
- Kanta od 10 kg
- Bure od 120 kg

UPOZORENJE:

Pri radu sa koncentrovanim dezinficijensom zabranjeno je jesti, piti ili pušiti. Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom. Obavezno koristite preporučena zaštitna sredstva prema tabeli:

Zaštita disajnih puteva:	Potpuna maska za lice, respiratorni filter A2-B2-P2
Zaštita ruku:	Zaštitne gumene rukavice, npr. Nitril
Zaštita očiju:	Zaštitne naočare sa potpunim krugom (korpaste)
Zaštita tela:	Potpuno hemijsko zaštitno odelo, npr. Tychem

Po završenom poslu obavezno oprati ruke.

KORISTITE BIOCIDNE BEZBEDNO! OBAVEZNO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

PROIZVOD I AMBALAŽU UKLONITI U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONIMA KOJI UREĐUJU OVU OBLAST.

Proizvođač: Interhygiene, Cuxhaven, Nemačka

Uvoznik: Žilović i Žilović d.o.o., Beograd, Beogradska 39/2

Telefon: 011 3247612

E-mail: beograd@zilovic.rs

Broj rešenja Ministarstva: 532-01-1740/2015-19

Serija i rok upotrebe su utisnuti na originalnom pakovanju.

Telefonski broj za hitne slučajeve: Nacionalni centar za kontrolu trovanja : 011/36 08 440
(telefon dostupan 0-24h)